

b901.
DE

INTERNA SUPPURATIONE,
VULNERUM ET ULCERUM
MAJORUM PERNICIOSA
COMITE.

DISSERTATIO
INAUGURALIS MEDICO-CHIRURGICA
QUAM
CONSENSU ET AUCTORITATE
GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS
IN
UNIVERSITATE LITERARIA
F R I D E R I C A G U I L E L M A
PRO SUMMIS
IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS

RITE SIBI CONCILIANDIS
DIE XIX. M. MARTII A. MDCCCXXXVI.

H. L. Q. S.
PUBLICE DEFENSURUS EST

AUCTOR
CAROLUS BOEGER
BEROLINENSIS.

OPPONENTIBUS:
FR. BOEGER, MED. ET CHIR. DR.
GUIL. ROST, MED. ET CHIR. DR.
FERD. DALMER, MED. ET CHIR. DD.

BEROLINI,
TYPIS NIETACKIANIS.

V I R O

ILLUSTRISSIMO, AMPLISSIMO

F. A. SCHULZ,

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTORI, INSTITUTI REGII MEDICO-CHIRURGICI FRIDERICO-GUIELMIANI DIRECTORI SECUNDO, EXERCITUS BORUSSICI MEDICORUM MEDICO PRAEFECTO, ORDINIS DE CRUCE FERREA IN SECUNDA, DE AQUILA RUBRA IN TERTIA CLASSE
EQUITI ETC. ETC. ETC.

PRAEPOSITO OPTIME DE SE MERITO,
DILECTISSIMO



HASCE

STUDIORUM PRIMITIAS

VERO ANIMI CULTU

D. D. D.

AUCTOR.

Jam a permultis et antiquioris temporis medicis de magno periculo dissertum est, quod ex vulneribus aegro minitaretur, si puris depositio, metastasis, ut vocant, exoriretur ad internas partes. — Omnes de periculo consentiunt, valde tamen differt de causis hujus phaenomeni et ratione qua oriatur. *Le Dran* (1), qui inter alios amplius hac de re loquitur, pus resorberi opinatur venis, inde que in circulationem transgressum in pulmonibus, sive hepate deponi; antecedere ejusmodi depositiones irregulares frigoris insultus, quos vehementes febris paroxysmi exciperent, qui brevi intermissionis tempore, usque ad mortem repeterentur. Huic sententiae, quod ad resorptionem per venas pertinet complures recentiorum accedunt, inter quos praesertim *Ribes*, *Velpeau* et *Maréchal* nominandi sunt — *Dance* (2) primus causam huius phaeno-

(1) Plaies d'armes à feu.

(2) Dance über Venenentzündung a. d. Engl. v. Himly.

meni in inflammatione posuit venarum in suppurantibus locis sitarum, ita quidem ut pus ex interna venarum superficie secretum, sanguini immistum ad varia organa mittatur. — Hanc sententiam prae ceteris *Blandin* et *Cruveilhier* defendunt. — *Cruveilhier* (1) praesertim de puris depositionibus in hepatice et pulmonibus per multa disseruit, sistema vasorum capillarium in auxilium vocans et phlebitidi summas fere in tota pathologia partes tribuens.

Qui pus ex vulneribus resorberi contendunt, hoc ex discisis nec conclusis venis, earumque resorbendi vi demonstrant. — Quod tamen ad prius horum argumentorum pertinet, non tantum post amputationes ejusmodi puris accumulationes observantur, sed etiam post exulcerationes internis causis exortas, ubi venae non correptae sunt. — Quod ad aliam de phlebitide pertinet sententiam, venae quidem saepe inflammatae sunt, praesertim post amputationem, tamen non intelligi potest, qua ratione immutatum per eas ducatur pus, praesertim cum et venaesctionibus in his casibus institutis, sanguis non mutatus reperiatur; et praeterea existent exempla ubi etiam post amputationem venarum inflamatio, si haecce intraverant phaenomena, non observata sit. Cur praeterea, et hoc argumentum ad utramque sententiam resero, in singulis semper organis tantum ejusmodi mutationes reperiuntur, et plerumque a parte affecta remotissimis; etsi enim et aliis locis sic dictae metastases occurront, ple-

rumque tamen in pulmonibus et hepate observantur; cur non proxime adjacentes partes occupant? Forsan anatomica disquisitio hasce tenebras magis dissipabit, tamen ex pathologia jam nunc nonnulla desumenda videntur de hac re. — Non amplius hic loquar de noxiis externis, quae in aegrum vulnere aut ulcere majori affectum agentes illa provocant phaenomena, ut refrigerium, animi affectus, diaeta inepta, repentina suppressio magnae puris secretio- nis ex ulceribus cachecticis, ob quae amputatio exempli causa facta est; sunt enim observatae ejusmodi sic dictae metastases et in aegris, qui ab omnibus illis noxiis remoti servabantur, et in iis, in quibus nulla habitualis, ut ita dicam, sublata erat secretio. — Sed commune aliquid habere videntur omnia illa exempla, praeter cetera symptomata, in quod nondum satis respectum est. — Semper enim phaenomena, quae puris metastasin indicant, eodem tempore intrare vidi, quo in vulnere aut ulcere eae mutationes sive praeparantur, sive modo processe- runt, quibus puris ad granulationes formandas apta procedere possit secretio, ubi simul et febris exoritur symptomatica, traumatica, et sivis pyogenetica, quae et in aliis organis praesertim circulationis et respirationis provocare potest inflammationem, quae cum adsit dispositio ad pus formandum hic facilius in suppurationem transeat, imprimis ubi sive ingenti vulnerum ambitu, sive nisu removendarum massarum, quae vulnus tegunt aut ulcens, alienarum, sphaceli, necrosis, aliorum, ipsa sit vehementissima. Ideoque non vera videtur puris translocatio, sed

(1) Anatomie pathologique du corps humain II. livraison.

inflammatio internorum organorum ex causa propria et singulari progressa et idcirco suo modo decurrentis suppurationem verisimile provocat. Nervorum systema non exiguae partes hic agere forsitan haud injuste contenditur, quum in omnibus his casibus, jam valde affectum et depresso sit, ipsa inflammationis symptomata non ita procedant, ut ex iis, quae post mortem reperiuntur, opinandum esset, totaque affectio occulte, eoque tamen perniciose decurrat, semperque, sit curatio accuratissima ad mortem perducat.

Nonnullos casus observare mihi licuit, brevi temporis spatio sibi succedentes, qui modo prolati valde probabilia reddere mihi videbantur. In omnibus pulmones et pleura erant, in quibus puris accumulatio inflammatione orta reperiebatur post mortem, quae antecedentes vehementissimos horrores secuta erat. In omnibus perniciosa illa symptomata exorta erant, quum viribus valde debilitatis, et nervorum systemate idcirco valde distento et correpto, majus naturae conamen intraret, in tribus eorum ad granulationem aptam provocandam, in alio ad necroticum os removendum; in quarto accesserunt amputatione ob fracturam complicatam eo tempore facta, quum sphacelus in ulcere fractura exorto sisiteret, et ad granulationes formandas apta jam adesset secretio, ubi febris nova traumatica, ad illam ut ita dicam pyogeneticam, in corpore valde debilitato accessit; in ultimo denique observabantur, quum phlegmone brachii amputationem pollicis insequens, in suppurationem transiret et tali ratione

inflammationis extensiōni respondens febris existet vehementissima. — Hosce casus, quos diversos inter se, pro una sententia certare puto, tradendi consilium cepi, dissertationem conscripturus, non quod nova prolatus essem, sed quod de re, hucusque valde obscura, et observationes tantum attulisse, jam operae pretium habui.

OBSERVATIO PRIMA.

T. V. operarius, viginti quatuor annos natus, cachectico habitu, qui serophuloseos vestigia adhuc sat luculenta secum tulit, die tertio mensis Octobris anni MDCCCXXXI ob ulcera necrotico - cariosa eruris dextri in nosocomio Caritatis auxilium petit. Remedia interna et externa fortissima in malum nimis inveteratum frustra adhibita sunt. Fistulae totum crus occupantes formatae ichoris, quam excitabant secrezione virium consumtionem maximam aegroto contraxerunt. Huc accessit gangraena nosocomialis, quae non parum attulit ad ulcerum ambitum augendum et vires magis etiam debilitandas. Attamen contigit, ut gangraena tolleretur et ulcera usque ad certum quandam gradum sanarentur; perfectam cicatrisationem necrosis arcutit. Jam apta interna roboranti curatione status aegroti eo mutatus et melior redditus erat, ut necrotici ossis exfoliationem et ulceris sanationem sperasses, quum repente mense Aprili insequentis anni progressis verisimile fistulosis ulceribus venae

saphenae magnae inflammatio exoriretur, quae conitante febri cacheeticum sere provocavit statum, in suppurationem transiit et exsudationem in genu articulationem effecit. Etiam hunc insultum superavit aeger. Quum tamen secretione ex tot ulceribus nimia et prava sustentata mors certissima aegro obstaret, maxime dubia quidem prognosi die XXII mensis Julii amputatio femoris facta est. Ipsam operationem sat bene superavit aegrotus et vulnus prima deligatione desumpta pro re nata bonam praebuit speciem. Sensim sensimque suppuratio provenit, unde optima granulatio speranda erat. Die octavo ligatura remota. Quod ad totum aegroti statum pertinet, hicce in melius mutabatur, quiete enim dormivit aeger, omnes secretiones normalem habebant qualitatem et, quae ante operationem adfuerat fere hectici febricitatio nunc sola majori pulsus frequentia suppuratione sustentata et debilitatis gradu haud exiguo continebatur.

Die decimo quinto post operationem institutam cum antecedente die optima fuisset et vulneris et aegroti ratio, repente horror ingens aegrotum invasit, qui horae quadrantem perdurans calore et sudore excipiebatur. Pulsus parvus erat tensus et frequentissimus, lingua sicca, facies collapsa. Inter horrorem anxie spiritum duxit aegrotus, qui antea omnipectoris affectione liber fuerat; aequaliter tamen ubique movebatur thorax et molestiae horrore finito desinabant. In vulnere ipso nulla observari potuit mutatio; per noctem nonnullas horas quiete dormivit aeger (V-

leriana cum Acido muriatico interne propinata). Sub vesperem insequentis diei inquietudine quadam antecedente denuo ejusdem modi insultus intravit, simulque de trahentibus doloribus in femore quereretur aegrotus et abdomine, qui sub attactu valde augebantur. Quae in vulnere secernebantur et nunc eadem erant. (Hirudines triginta ad femur et abdomen, saturatio cum aqua Laurocerasi interne). Verae intermissiones post hos insultus non intrabant, semper erat pulsus valde frequens, tensus et debilis, cutis arida et lingua sicca; memorabilis erat status inflammationis cum maxima debilitate mixtus. Tertio die denuo ejusmodi ab horrore incipiens exacerbatio febris intrabat, et ipsa cum magna pectoris oppressione mixta, quae tamen remittente febri etiam remittebat. Nunc primum mutatio quadam in vulnere percipiebatur. Secretum enim parcius et serosum, basis vulneris antea rubicunda nunc livida, tanquam deasset vis secernendi (Unguentum basilicum cum Tinctura Myrrae impostum). Postridie horror iterum rediit, simul conjunctus vehementi abdominis dolore, vomititionibus, intumescentia ceterisque peritonitidis signis, ita, ut hirudines quadraginta appositae sint et interne calomel propinatum. In vulnere nullos persensit dolores aeger, tamen hoc et ambitus ejus pastosa erant et tanquam mortua, margines dissoluti, basis lividis massis, quae sphacelo oriuntur, tecta. Sequenti die collapsus maximus continua magna febricitatio et repetiti horrores, qui semper maxima respirationis

anxietate coniungebantur. Deliria intrabant blanda et signis nimiae debilitatis praevalentibus obiit aeger.

Sectio cadaveris.

Praeter magnam puris depravati accumulacionem in femoris tela cellulosa et sphacelosam muscularum mortificationem vena cruralis certissima inflammationis signa prae se tulit; interna enim ejus superficies aspera erat, sine nitore, ipsae tunicae incrassatae, lumen plastico exsudato impletum; haecce erat ratio usque ad eum locum, quo vena saphena immittitur, quod excurrebat plane integrum reperiebatur. Haecce inflammationis extensio plane respondebat extensioni inflammationis telae cellulosa circumdantis.

In cavo abdominis ne vestigium quidem inflammationis, neque in peritonaco neque in hepate major sanguinis accumulatio reperiebantur. Vene normalem ubique obtulerunt structuram. Eo maiores erant mutationes in pectore, pulmo sinister, ejus pleura, pericardium et cor ipsum non mutata. Contra pulmonis dextri superficies maculis sanguinolentis obducta, quae originem duxerunt ex hyperaemia lobulari; ad latus et in superficie posteriore complures maculae ex albido griseae, in quarum circuitu summum gradum ascenderat hyperaemia, ita ut sat luculenter progressus inflammationis et normalis origo demonstrari posset. Vene et arteriae nullam mutationem subierant, pleura lateris dextri costalis et pulmonalis plastico exsudato obducta erat et hic vasa nova reticula formantia, omnino varia inflammationis stadia observari potuerunt,

saccus pleurae meri puris quatuor fere uncias continebat. In cerebro nullae mutationes reperiebantur.

OBSERVATIO SECUNDA.

C. B., auriga, trigesimum annum agens, sat firma constitutione praeditus, ob bubonem scrophulo-syphiliticum lateris sinistri, antegressa urethrite ortum in nosocomium Caritatis recipiebatur (die XVIII. mensis Martii anni praeterlapsi). Quum jam in suppurationem transiisset inflammatio, aperitus est bubo et ulcus inde provocatum secundum characterem tractatum; decimo die postquam incisio facta est antecedente febricitatione haud magna gangraenae nosocomialis vestigia indolis inflammatoriae observabantur. Detractione sanguinis topica sat magna et repetita, fomentationibus *Rustii* et remediis antiphlogisticis interne adhibitis quatuor fere dierum spatio status inflammatorius tollebatur. Attamen ut ipsa ulceris gangraenosa ratio, qua lente in dies crescere et majorem ambitum acquirere solet, mutaretur nonnisi fortissimis remediis in usum vocatis totaque superficie putrida ferro extincta, duabus demum hebdomadibus praeterlapsis contigit. Quae ab initio aderat synocha gastrica et contagio ipso et prava secretione, indeque orta virium nimia intentione synochi magis characterem induerat, praesertim cum antea quam plane tolleretur gangraena haemorrhagia, quae originem ex vena crurali ducente videbatur sanguinis copiam sat considerabilem detraxit ita, ut et hac ratione maxime debilitaretur aegrotus. Quum plane evanisset gangraena in ul-

ceratione, quae laxam praebuit speciem, unguentum basilicum cum tinctura myrrae impositum, et interne roborantia et leniter excitantia propitata sunt. Insequentibus diebus res haud male processit; quae ulcere secernebantur puris meliorem indolem prae se tulerunt, margines antea dissoluti basi acreverunt. Exacerbationes febriles vespertinae quotidie quidem rediere neque vires celeriter restituebantur, tamen ex antea robusta aegri constitutione optimum sperare licebat, imprimis quum nulla organorum internorum affectio comitaretur febrem.

Ex improviso die nono postquam gangraena nosocomialis plane sublata est, aeger majore conquerebatur dysphoria, quam mox ingens horror cum magna pectoris oppressione exceptit; dorso incumbens aeger anxi spiritum duxit non quidem dolores in pectore accusans sed potius sensum pressionis, quem asthmate correpti percipiunt, et qui apud aegrum in congestione sanguinis ad internas partes horrore provocata originem habere videbantur, praesertim cum remittente horrore dolor quoque evanesceret. Horrorem insequebatur calor ardens, deliriis stipatus ex quibus resuscitari potuit aeger; cutis perpaucum tantum insudavit. Ulcus, quod, ut jam dictum, ex compluribus diebus pro re nata optime se habuerat et modo granulationes proferre incepit aliam nunc praebuit speciem. Quae secrevit parca et magis serosa facta sunt, basis lurida et praesertim eo loco, quo vasa decurrunt majora livida et punctulis eruentis obtecta. Quum hoc, licet sic vocari, paroxysmo finito magua remaneret

irritatio pulsu et congestionibus versus caput expressa, ad internum usum accepit aeger Kali tartaricum cum Aqua Laurocerasi; ulcri, ut alteretur secretio Hydrargyrum praecipitatum rubrum inspergebatur, sed nihil omnia haec effecerunt, postridie enim saepius redierunt horripilationes magna et jam descripta pectoris oppressione conjuncta; pulsus parvus, debilis, frequentissimus maximam virum dedolationem indicavit. Ulcus novam plane induerat formam, et difficile erat dictu, quisnam ei insit character et indoles, nihil secernens tanquam mortuum, sit venia verbo, eminentias praebuit luridas et sinuositates, margines eorumque circuitus relaxati omni turgore carebant. Ingenti denuo horrore exorto simul cum magna praecordiorum anxietate et deliriis blandis sub vesperem ejusdem diei obiit aeger.

Sectio cadaveris.

Ulcus septem fere pollicum latitudinem exaequans introrsum lineam albam, sursum ligamentum Poupartii attingens, deorsum superiore et anteriore superficiem femoris corripiens eo jam penetraverat, ut in basi fibrae ac tendo musculi obliqui externi et fascia lata, partim granulatione laxa obducta consiperentur. Mediae superficie aliquid pollicem et dimidium infra ligamentum Poupartii venae cruralis anterior paries formaverat, quae tamen ichore correpta et corrosa sanguinis jacturam ante octo dies ortam effecerat. Venam hoc loco explevit coagulum flavi coloris, pollicem et dimidium deorsum lineas fere duas sursum ad-

tingens, quod excepit aliud duas pollices sursum extensum rubrum ichore mixtum in mere sanguineum transiens. Venae saphenae magna pars, quae per ulceris basin decurrebat oblitterata reperiebatur. Omnes hae venarum mutationes inflammationi originem debebant, crassiores enim praeterea jacebant tunicae earum firmiores et interna superficies quemque deposuerat nitorem. Vena hypogastrica, cava inferior ejusque rami aequae ac arteria cruralis nihil morbosci obtulerunt. Peritonaeum, quod ulceris basi prope adjacebat ne congestionis quidem signa praebuit. Glandulae inguinales emollitae erant et rubro colore tinctae.

Cavo cranii aperto cerebri meninges sanguine valde confertae et sub ipsis tunicis duae fere unciae exsudati seri aderant.

In caro thoracis haec fere reperta sunt: pulmo sinister pleurae costali firmis et membranaceis exsudationibus inveteratis arce adhaerebat, paullo collapsus non mutatam praebuit structuram; in dextri pulmonis superficie praesertim versus marginem superiorem in pleura costali et diaphragmatis parte, quae pleuram adspicit, exsudatum e flavo rubrum, laxum reperiebatur, sub quo pleura ubique inflammatum erat. Pulmonis substantia integra, excepto lobo superiore, qui prima inflammationis vestigia praebens multum serum continuit, hic illic imprimis in superficie jam transierat in griseam sic dictam hepatisationm, tamen luculentissime variorum stadiorum vestigia aliquaque in aliud transitum scalpello persequi licebat, praeterea saccus pleurae dex-

ter duas fere libras fluidi turbidi e griseo flavi continet. Pericardium et cor a norma recedens nihil obtulerunt. In abdomine organa integra erant.

OBSERVATIO TERTIA.

A. L., operarius, vigesimum annum agens, tumorem rheumaticum genu dextri, quem refrigeratione sibi contraxerat, ita neglexit, ut inde caries et necrosis ossium articulationem formantium exoriretur, quae quum aeger in nosocomium recipetur jam eo progressae erant, ut amputationem postularent, praesertim quum magna virium consumptio in dies augeretur et fere jam in hecticam incidisset aeger. Die sexto mensis Januarii hujus anni amputatio in femoris continuitate facta est. Sanguinis jactura haud parva erat, prima intentio, quam provocare tentatum est, non effecta et post trium dierum spatium totum vulnus pure obiectum erat. Febris, quae comitabatur localem affectionem synochalem prae se tulit characterem, ita, ut fortiora antiphlogistica interne adhilita essent. Vulnerum ipsum paulo laxum tamen pro re nata bonum praebuit secretum. Die decimo nono postquam operatio instituta est et res jam ita bene processit, ut nonnisi ab ingenti debilitate aliquid timendum esset, subito status pejor factus. Febris vehementer aucta, horrore insignis, pulsus frequentissimus, celer, parvus; praeterea aeger de doloribus in abdome et pectoris magna oppressione concrebatur. Secretio vulneris cessavit et femur oedemate correptum. Decocutum Chinae cum tinctura

Myrrhae vulneri applicatum, interne acidum muraticum propinatum est, tamen inde nihil effectum, febris indies augebatur et die tertio postquam tanto pere in pejus versa est res, obiit supremum diem aegrotus.

Sectio cadaveris.

Vena cruralis, quae non ligata erat, usque ad ligamentum Poupartii inflammatione correpta et lympha plastica coagulata reperiebatur impleta. Totum ossis femoris periosteum inflammatum suppurationem provocaverat, quae usque ad articulationem femoris penetrabat. Cavi abdominis organa integrarant, praeter lienem, qui magna sanguinis nigri copia valde intumuerat.

Pleura sinistra praesertim versus dorsum inflammata erat partim jam exsudato e griseo albo obiecta. Pulmo ipse in superiore lobo sanguine abundavit et partim in hepatisationem rubram mutatus, quae in superficie jam ex parte in griseam transierat, ita ut et in hoc easu lobulari inflammatione orta esset illa puris depositio. Pulmo dexter serni magnam continuit quantitatem, tamen ubique pervius erat et incisus crepitacionem excitavit.

OBSERVATIO QUARTA.

C. L., nauta, firma constitutione praeditus, quinquaginta annos natus, die XIV. mensis Augusti anni praeterlapsi in Caritatis nosocomium ob erysipelas capitis phlegmonodes receptus est. Stadium febrile jam finitum erat, crustae e nigro fuscae obtinuere

caput et pluribus locis in suppurationem transierat telae cellulosa inflammatio, ita, ut complures incisiones ad pus removendum necessariae fierent. Ceteroquin optime se habuit aeger, exigua tantum febrilis excitatio adhibita saturatione evanuit.

Infra octo dierum spatium emolitiae omnes crustaie facile removeri potuerunt. Vulnera incisione exorta jam initio mensis Septembris cicatricibus obducta erant, excepto majore, quod in medio crani duorum pollicum longitudinem exigebat. Margines ejus basi dissolvebantur et intumuerunt, secretum magis serosum, granulationes laxae albidae, non multo post totum vulnus nosocomiali gangraena correptum, quae torpidum induit characterem nec magnos dolores, nec vehementem febricitationem effect, attamen, ut et in hac forma fieri solet, ulceris ambitum celeriter valde auxit et cum adhibitis fomentationibus aromaticis et vino camphorato non cederet, ferro candente removeri debuit. Quatuor diebus postquam hoc in usum vocatum est omni gangrenoso suppuratione remoto ulceris superficies granulationibus optimis obiecta conspiciebatur. Medio in ulcere cranii exigua pars periosteum denudato erat, ita ut ossis necrosis oritura timenda esset; ipso aeger ceterum optime se habuit. Die XXII. mensis Septembris subito alacrius febricitare incepit, sanguine vehementer versus caput fluente. Ulcus ipsum eo mutatum erat, ut major ossis pars periosteal orbata et hic illic jam necrosi correpta esset. Suppuratio in circuitu optime processit pure ipso nil mutato (Hirudines decem pone aures ap-

plicatae, interne ammonium muriaticum cum nitro datum). Quum tamen per noctem nimis augerentur congestiones, deliria accederent, pupillae coarctarentur, pulsus frequentissimus fieret celer et durus, sanguinis libra missa et calomel porrectum. Remittebant mox hae inflammatoriae cerebri affectiones, tamen ex suppuratione permagna ad exfolianum os necrosi correptum necessaria, ne facile rediret cerebri irritatio timendum erat.

Die primo mensis Octobris aegrum repente ingens horror invasit, calore ardente et magna insudatione exceptus. Sex horarum spatio finitus erat hic insultus, tamen vera intermissio non intravit, semper enim magna pulsus excitatio et sensuum obnebulatio aderat. In ipso ulcere nihil mutatum (chininum sulphuricum cum opio). Postridie paroxysmus repetitus, non quidem ita vehemens, tamen majorem etiam virium dedolationem relinquens. Nihilominus locale malum in dies meliorem accepit formam, granulatio optima obtextit ulcus usque ad margines ossis necrosi correpti. Ob ingentem virium consumptionem, quae subito intrante diarrhoea magis increvit, Moschus cum Elaeosaccharo, Cinnamomi et Opio datus est. Paulo melior reddebat aegroti status his remediis, diarrhoea cessavit, cerebrum liberum factum est. Tamen intrabat symptoma, quod majorem affectionem ipso condicioneum excitavit. Tussis nempe vexare incepit aegrum sicca, cum pressionis sensu pone sternum conjuncta, quum tamen praeter respirationem celeriorem nulla adessent symptomata, catarrhalis affectio, ut

saepius fit in gravioribus morbis bronchos affecisse videbatur. Leniter expectorantia data sunt. Post tres vero dies tussis majorem acquisivit vehementiam suffocationis fere insultus provocans; pulso parvo, frequentissimo et debili. Extremitates inferiores intumuerunt, deliria intrabant et mox in veram agoniam incidit aeger, quae nihil mutato ulceris habitu per duodecim fere horas perduravit et praesertim respiratione maxime oppressa excelluit.

Sectio cadaveris.

In media calvaria, in utroque osse bregmatis periosteum duorum pollicum ambitu evanuerat et necrosis utramque laminam ossis penetraverat; dura mater sanguine impleta, substantia cerebri ipsa, quae situ respondit ossi necrosi correpto lymphae plasticae granulis obiecta, substantia corticalis sanguine plena medullaris eodem loco emollita puris qualitatibus praebuit, quo remoto cavum conspiciebatur, cuius paries membrana, quae abscessibus esse solet obductae et innumeris punctis eruentis obiectae erant, ita ut cerebri abscessum fuisse appareret; cetera cerebri substantia sana.

Infra pleuram costalem et pulmonalem magna copia lymphae plasticae aderat, qua pluribus locis cohaerebant inter se; aliis locis vasa recenter formata et punctuli sanguinis initia inflammationis prouenerunt. Saccus pleurae sinister purulentum continuit exsudatum; pleura ipsa gelatinosis quasi massis obiecta hic illuc inflammationis varia stadia documentavit. Apex pulmonis sinistri tubercula mi-

iliaria continuit, inferior lobus sanguine abundavit, in superficie maculae griseo-albidae erant, quae pure in substantiam infiltrato prodierant. Parenchyma proxime adjacens hepatisationm rubram ostendit, bronchiorum interna membrana rubre tincta et relaxata, vasa majora, cor ipsum et pericardium integrâ fuerunt. In dextro etiam pulmone signa inflammationis aderant, sero abundans rubram hepatisationm dispersim documentavit. In utroque pulmone illae mutationes praesertim in superficie versus dorsum et diaphragma in conspectum venerunt.

In abdominis cavo nihil abnorme inventum praeter magnam ventriculi contractionem, longiore ciborum abstinentia provocatam.

OBSERVATIO QUINTA.

Maria N. mulier robusta, quinquaginta quatuor annorum, quae semper optima gavisa erat valetudine, complicatam cruris dextri fracturam sibi contraxit, ideoque in nosocomium Caritatis die XXIII. mensis Septembris recepta est. Gangraena et sphacelus partium mollium una cum vehementi febri firmam aegrotiae constitutionem ita jam invaserat, ut hectica febris instaret, et nonnisi maxime infusa prognosi, quum sphacelus sisteret, et magna neque mala secretione jam removeretur, amputatio femoris, ut unicum remedium ex quo aliquid sperandum esset, die VI. mensis Octobris perficeretur. Sanguinis demissio haud exigua intravit, et quod pejorem etiam reddidit prognosin, prosluvium ex vena crurali nonnisi ligatura sistendum erat. Non multo

post operationem ingenti horrore corripiebatur aegra, quem calor ardens et magna insudatio exceptit. Hic insultus initio ad magnam sanguinis jacturam referebatur, tamen jam postridie eodem fere tempore rediit et magna capititis obnebulatione et pectoris oppressione conjungebatur. Vulnus ipsum lympham valde serosam secrevit, quae post tres fere dies ichoris naturam induit, et mox eandem praebuit speciem, quae antea vulneris osse fracto provocati fuerat, quum sphacelo correpta esset. Nullo et fortissimo denique remedio, ferrum candens dico, adhibito, alia provocari potuit secretio. Mox totum femur intumuerat, vulnus versus lividum colorem praebens. Aegra, cui, quum quotidie repeterentur insultus illi, chinimum sulphuricum cum opio porrigebatur, in dies magis collabebatur, febricitatio vehementissima non desiit, deliria eam non reliquerunt. Respiratio tantum si horror intravit, opprimebatur, ita ut in pectore malum aliquid inhaerere non suspicandum esset, quum alias nullum observaretur grave symptoma, et febricitatio quae symptomatica erat, sat superque ex locali malo derivari potuit. Die undecimo mensis Octobris horrore de novo correpta supremum diem obiit aegra.

Sectio cadaveris.

Inquisitio femoris omnes partes vulnus constituentes molles sphacelo correptas ostendebat exceptis arteriis et venis. Venae cruralis tunicae valde incrassatae erant et induratae, ipsa usque ad ligamentum Poupartii exsudatum continuuit lymphatico

plasticum, quod inflammationum est. Cetera pars venarum in cavo abdominis plane integra erat et sana; organa abdominis omnino in optimo statu reperiebantur. Contra alia erat res, aperto thorace. In utroque enim latere pleura costalis et pulmonalis magna copia exsudati purulenti obiecta erat, quod ex parte jam plasticam induerat naturam. Puris saccum implebant. Ex parte quoque in hoc casu inflammatio non eo jam progressa erat, vasa recentior formata, reticula formantia, hic illuc dispersa incipientem inflammationem documentabant. Non minus quam pleurae, pulmones quoque affecti erant. Anterior ejus pars ad sternum vergens et totus pulmo dexter integer erat, quod tamen ad dorsum spectat sinistri pulmonis magnam hyperaeemiam ostendit lobularem, quam in nonnullis lobulis jam exsudationes secutae erant, unde partim rubra hepatisatio exoriebatur, partim grisea et magis jam purulenta, ita ut tota posterior pulmonis sinistri superficies maculis griseo albis tanquam inspersa esset. Pericardium cum pleura ex parte concretum. Cerebri meninges sanguine abundabant, substantia et ventriculi nullam mutationem perpessi sunt.

OBSERVATIO SEXTA.

C. K. sutor, viginti quinque annos natus robusta corporis constitutione ob panaritium pollicis sinistri in nosocomium Caritatis recipiebatur (die III. mensis Septembris). Inflammatio secundae pollicis phalangi inhaerebat et a periosteo ortum sumsisse

videbatur. Ulcus, quod jam formatum erat, necrotici formam habuit. Remedia, quae adhibebantur manserunt frustranea, inflammatio indies increvit, et ne manum perderet aeger, prima phalanx removenda erat. Die V. mensis Octobris amputatio in primae phalangis continuitate facta est. Duodecim fere horas post operationem ita intumuit truncus et doluit, ut deligatione remota, fomentationes ex aqua saturnina tepidae necessariae fierent. Jam sub finem secundi diei tota superficies magna integri puris copia obiecta fuit. Aeger, qui operationem bono animo subierat, et omnino antea bene se habuit, nunc conqueri incipit de magnis doloribus in superficie volari antibrachii et articulatione ipsa cubiti. Intumefactae erant haec partes et rubicundae. Pulsus valde excitatus, tensus, calor toti corpori superflusus, pulsationes venarum colli, et capitis dolores febrem indicabant symptomaticam, quae ex majori inflammatione, quam quae pollici inhaerebat, originem ducere debuit. Applicatae sunt viginti hirudines ad antibrachium et unguentum hydrargyri inficatum. Nominata tamen symptomata localia, aucta progrediebantur. Tumor tensus ruber, plante inflammatorius totum brachium corripuit, glandulae axillares intumuerunt, et sub musculi pectoralis magni extensione eosdem fere persensit aeger dolores, qui in brachio erant. Versus totum igitur brachium et ad pectoris latus dolens hirudines quinquaginta applicatae, unguentum cinereum inficatum fomentationes Rustici impositae sunt, et quam totius corporis reactio nimia esset, ita ut et deliria intrarent, venaesectio

librae et dimidia instituta, nitrum interne propinatum. Jam insequenti die tamen eo augebantur inflammationis phaenomena, ut eadem sanguinis copia mitteretur, nitri dosis augeretur. Vulnus in pollice pus secrevit, quod ad granulationes provocandas nimis fluidum erat, idque praesertim ex nimia tensione inflammatoria derivandum, quam ob rem et hic fomentationes nominatae applicabantur. Remissio hac frequenti sanguinis detractione intrabat exigua tantum, inflammatio brachii in dies aucta, ex parte in suppurationem transiit. Sub vesperem sequentis diei tantopere exacerbavit febris, ut nova iterum venaesectio necessaria fieret, et calomel porrigeretur.

Qua fortissima antiphlogosi quum symptomata inflammatoria generalia paullo remitterent, locale malum semper ingravuit. Suppuratio intravit totius cellulosa brachii; in volari superficie prope manum cute perforata exortum ulcer celeriter sphacelosum induit characterem, digitus minimus quoque sphacelo corripiebatur. Consumtio virium ingens intravit, congestiones ad caput passiva deliria blanda suscitarunt transitoria, anxie respiravit aeger, de doloribus in pectore prementibus conquerens. Exploratio pectoris ubique sonum respiratorium indicavit, praeter locum illum, qui externe inflammatione corruptus describebatur, hic enim exploracionem instituere non licuit. — Tussis non aderat. — Versus vesperem quotidie intrabant horrores cum deliriis complicati, usque ad mortem, quam die XIX. mensis Octobris obiit aeger.

Sectio cadaveris.

In disquisitione anatomica partis affectae praesertim memoratu dignae erant puris depositiones diversis manus et brachii locis. A pollice enim pus trans superficiem ulnarem et volarem ossis metacarpi intra musculos adductores pollicis, indeque intra flexorem digitorum sublimem ad volam manum depositum erat, unde exulceratio reliquis tribus digitis incolubibus, ad digitum minimum extensa, molles ejus partes ad gangraenam deduxerat, ossibus hic illic denudatis. — A vola manu suppuratio progressa infra ligamentum carpi volare, cellulosam infra flexores manus sitam plane destruxerat. In articulatione cubiti, venae superficiales pure impletæ tunicam internam incrassatam, asperam praebuerunt, eo usque ubi in venam axillarem, quae et ipsa tali ratione mutata erat, transeunt. Vena subclavia et quod excurrit venarum usque ad cor ipsum plane integra erant. A cubiti articulatione suppuratio magis subcutanea reperiebatur, et totam cellulosam usque ad axillam et abhinc sub musculo pectorali minori et intercostalibus sitam corripuerat.

In cavo thoracis saccus pleurae dexter sat magna seri copia pure mixti impletus; pulmonalis hujus lateris pleura magis solido fibroso exsudato obiecta erat. — Non minus quam pleura et pulmo ipse laboravit; in tota enim ejus superficie praesertim posteriore, pneumoniae lobularis signa hic illic dispersa erant, varia in singulis lobulis observare

licuit hepatisationis stadia, quae in superficie praesertim grisea puris qualitatem induerat, interpositis pulmonum partibus liberis. — Pulmo sinister tantum solita majorem infiltrationem praebuit, excepto lobo inferiore, qui jam in rubram transgressus erat hepatisationem.

Abdominis cavum nullam ostendit organorum mutationem.

V I T A.

Ego *Carolus Fridericus Guilelmus Boeger*, die **XXIII.** mensis Junii anni **MDCCCXIII.** Berolini patre *Friderico*, matre *Carolina* e gente *Jerg*, quos dilectissimos parentes hucusque mihi incolumes servavit Deus, natus evangelicae fidei addictus sum. Literis, quae ad altiora studia viam munivunt in gymnasio Joachimico, quod tum directoribus *Cel. Snethlage* et *Cel. Meinecke* florebat, imbutus et maturitatis testimonium adeptus Instituti medico-chirurgici Friderici Guilelmi civibus mense Aprili anni **MDCCCXXXI** sum adnumeratus, et per quadriennium hisce praelectionibus interfui:

Cel. Wolff de hodegetice, logice et psychologia; *Ill. Link* de botanice, historia naturali et toxicologia; *Ill. Schultz* de botanice;

Beat. Hermbstaedt et *Cel. Turte* de physice, chemia et pharmacia; *Beat. Rudolphi* et *Ill. Schlemm* de anatomia et de arte cadavera rite secandi; *Beat. Rudolphi* et *Cel. Eck* de physiologia et methodology; *Ill. Lichtenstein* de zoologia; *Ill. Hufeland* de pathologia et therapia generali et speciali, et de semiotice; *Ill. Horn* de pathologia speciali, de morbis mentis, et de syphilide; *Ill. Osann* de materia medica, fontibus medicatis et de auxilio in repentinis vitae periculis ferendo; *Cel. Casper* de arte formulas medicas concinnandi, et de medicina forensi; *Ill. Wagner* de medicina forensi practica; *Ill. Hecker* de Celsi libris et Burserii institutionibus; *Ill. Kluge* de arte fascias applicandi, de chirurgia generali et operativa, de fracturis et luxationibus, de arte obstetricia; *Ill. Juengken* de chirurgia speciali et operativa, et de morbis oculorum; *Cel. Froriep* de anatomia chirurgica; *Ill. Bartels* et *Cel. Wolff* exercitationes clinicas medicas; *Ill. de Graefe*, *Ill. Rust*, *Cel. Dieffenbach* et *Ill. Juengken* chirurgicas frequentavi. Praeterea quoque interfui praelectionibus *Cel. Gurlt* de anatomia animalium domesticorum; *Cel. Reckleben* de zoodiaete et epizootiis, *Cel. Nau-*

mann de equorum habitu; clinicum veterinarium *Cel. Hertwig* etiam frequentavi.

Omnibus his viris honoratissimis maximas semper debebo gratias.

Quadriennio studiorum absoluto medici inferioris munus in nosocomio Caritatis suscepit, quo etiam nunc fungor. Eo peracto Postampium me conferre jussus sum, ut medici militaris apud hastatos officia persolverem.

Jam vero tentaminibus et examine rigoroso rite absolutis, spero fore, ut summi medicinae et chirurgiae honores ex gratioso medicorum ordine mihi tribuantur.

THESES DEFENDENDAE.

1. *Puris veras metastases existere nego.*
 2. *Vulnera puncta prima intentione sananda.*
 3. *Febres malignae nullum certum morborum genus
constituant.*
 4. *A pathologis statutum discriminem inter morbos
ipsos eorumque causas proximas vero divisionis
fundamento niti dubito.*
 5. *Longaeva experientia absque sanis artis princi-
piis inutilis est.*
-